

Dextrose-Gel 40%

Version 01

Dextrose-Gel 40%

Eine der grössten Erneuerungen der Ende 2020 von der Schweizerischen Gesellschaft für Neonatologie verfassten Empfehlungen zur Prävention und Therapie der Hypoglykämie von Neugeborenen auf der Wochenbettstation ist die Verwendung von Dextrose-Gel 40%.

Presentation: orales Gel in einer Konzentration von 200mg Glucose in 0.5ml

Indikation: zur **Prophylaxe der Hypoglykämie** bei Neugeborenen mit erhöhtem Hypoglykämierisiko (in der ersten Lebensstunde)

Zur raschen enteralen **Therapie bei Verdacht auf Hypoglykämie**

Dosierung: Einzeldosis für Prophylaxe und Therapie:

0.5ml/kg/Dosis (= 200mg/kg/Dosis)

Wenn die BZ-Kontrolle nach einer ersten Hypoglykämie wieder einen Wert < 2.6mmol/l zeigt, darf das Gel wieder verabreicht werden.

Die Kontaktaufnahme mit der Neonatologie muss anschliessend unverzüglich erfolgen.

Dextrose-Gel 40% kann in den ersten 48 Lebensstunden wiederholt gegeben werden, wobei im Falle wiederholter Hypoglykämien immer der Dienstarzt/die Dienstärztin informiert werden soll.

Verabreichung: Einreiben in die Innenseite der Wange
Einzelpackung à 2.5ml, für den einmaligen Gebrauch.



Bestellung: Intern (LUKS) über Spitalapotheke
Extern: Apotheke Dr. G. Bichsel AG, Bahnhofstrasse 5a, 3800 Interlaken
033 827 60 00, apotheke@bichsel.ch

Erstellt: Matteo Fontana LA Neo	Geprüft: Martin Stocker, NeoKader	Freigegeben: Matteo Fontana LA Neo
Datum: 03.06.2021	Datum: 16.06.2021	Datum: 18.06.2021
Datei: Informationsblatt Dextrose-Gel 40%.docx		Seite: 1 von 1