



## Perianalabszess - Elternmerkblatt -

Ihr Kind wurde bei uns aufgrund eines Perianalabszesses operiert. Der postoperative Verlauf und die Überwachung bei uns waren unauffällig – daher ist der Austritt nach Hause möglich.

### Dies ist für die nächsten Tage und Wochen zu beachten:

- Bei Schmerzen dürfen Schmerzmittel gegeben werden. Entsprechende Schmerzmittel haben wir Ihnen mitgegeben oder Ihnen ein Rezept ausgehändigt.
- Fortführen der antibiotischen Therapie mit \_\_\_\_\_ für weitere \_\_\_\_\_ Tage, das heisst bis und mit \_\_\_\_\_.
- Regelmässiges Ausduschen der Wunde mit \_\_\_\_\_ nach jedem Stuhlgang bis zur gesicherten Wundheilung.
- Sitzbänder mit \_\_\_\_\_ x täglich bis zur gesicherten Wundheilung.
- Wir empfehlen ansonsten bis zur gesicherten Wundheilung keine rektale Manipulation.
- Wir bitten um eine Wundkontrolle in \_\_\_\_\_ Tagen beim Kinderarzt. **Bitte vereinbaren Sie hierfür selbstständig einen Termin.**
- Eine Fadenentfernung entfällt.
- Fadenzug / Laschenzug \_\_\_\_\_ Tage postoperativ, freundlicherweise durch den Kinderarzt.
- Eine ärztliche Wiedervorstellung ist bei Fieber, erneuter Zunahme des Lokalbefundes, lokalen Entzündungszeichen oder einer Verschlechterung des Allgemeinzustands empfohlen.
- \_\_\_\_\_