Impfschema Neugeborene
Version 2 (2026-01)

kinderspital zentralschweiz
LUZERN

<table>
<tr><th rowspan="3">Alter</th><th colspan="2">Basisimpfungen</th><th colspan="2">Expositionsimpfung</th><th colspan="2">Saisonale Impfungen</th><th colspan="2">Ergänzende Impfungen</th></tr>
<tr><td colspan="2">DTPa-IPV-Hib-HBV, PCV15</td><td colspan="2">Hepatitis B, wenn Mutter HBsAg pos</td><td>RSV</td><td>Influenza</td><td>Rotavirus</td><td>Meningokokken Gr. B</td></tr>
<tr><td colspan="2">Infanrix Hexa, Vaxneuvance</td><td colspan="2">Engerix</td><td>Beyfortus</td><td>Influvac / Fluarix</td><td>Rotarix *</td><td>Bexsero**</td></tr>
<tr><td>Geburt</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">zusätzlich passive Immunisierung</td><td>Wenn Austritt zwischen Oktober und März *</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1 Monat</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td rowspan="9">wenn Geburt / Austritt zwischen April und September

=> im Oktober</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2 Monate</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2 Monate + 2 Wochen</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td rowspan="3">Eine Woche vor Austritt falls mindestens 9 Wochen alt

(mindestens eine Woche nach den Basismpfungen)***</td></tr>
<tr><td>3 Monate</td><td colspan="2">Nur wenn Geburt <32+0 SSW oder Geburtsgewicht < 1500g</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3 Monate + 2 Wochen</td><td colspan="4"></td><td></td><td rowspan="2">ab 15. Lebenswoche**</td></tr>
<tr><td>4 Monate</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4 Monate + 2 Wochen</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6 Monate</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>Nur wenn Geburt <32+0 SSW oder Geburtsgewicht < 1500g</td><td></td><td></td></tr>
</table>

* **Beyfortus**:

- Frühgeborene mit einem Gestationsalter < 32+0 SSW werden ab erreichen eines korrigierten Alter von 35+0 SSW geimpft, **sofern dieses in den Monaten Januar bis März** liegt (Schutz bereits während des stationären Aufenthalts bei potenzieller Exposition durch Angehörige und Personal).
- Auf ausdrücklichen Wunsch der Eltern kann die Gabe bereits ab einem korrigierten Alter von 32+0 SSW erfolgen.

** **Rotarix** (orale Impfung):

- Ab der 15. Lebenswoche Eltern ansprechen, da die 1. Dosis spätestens bis zum Alter von 15 Wochen + 6 Tagen durchgeführt sein muss.
- Am liebsten 2–3 Tage vor Entlassung verabreichen.
- Bei früherer Entlassung: Vermerk im Procedere, dass die Impfung bis spätestens 15+6 durch die Kinderärztin bzw. den Kinderarzt erfolgen soll.

*****Bexsero:**

- Nicht gemeinsam mit der Grundimmunisierung verabreichen.
- Bei Kindern, die nach der 2-Monats-Impfung mit vermehrten Sättigungsabfällen reagiert haben: Impfung stationär planen, am liebsten erst ab 3 Monaten + 2 Wochen wenn vermutlich noch stationär.
- Paracetamol p.o. zur Fieberprophylaxe:
  → Fix alle 6 Stunden, insgesamt 4 Dosen
  → Erste Dosis 6 Stunden nach der Impfung

Angepasst vom : Schweizer Impfplan 2025