

Impfschema Neugeborene

Alter	Basisimpfungen	Expositionsimpfung	Saisonale Impfungen		Ergänzende Impfungen	
	DTPa-IPV-Hib-HBV, PCV15	Hepatitis B, wenn Mutter HBsAg pos	RSV	Influenza	Rotavirus	Meningokokken Gr. B
	Infanrix Hexa, Vaxneuvance	Engerix	Beyfortus	Influvac / Fluarix	Rotarix *	Bexsero**
Geburt		zusätzlich passive Immunisierung	Wenn Austritt zwischen Oktober und März			
1 Monat			wenn Geburt / Austritt zwischen April und September => im Oktober			
2 Monate						
2 Monate + 2 Wochen						Eine Woche vor Austritt falls mindestens 9 Wochen alt (mindestens eine Woche nach den Basimpfungen)**
3 Monate	Nur wenn Geburt <32+0 SSW oder Geburtsgewicht < 1500g					
3 Monate + 2 Wochen					ab 15. Lebenswoche*	
4 Monate						
4 Monate + 2 Wochen						
6 Monate					Nur wenn Geburt <32+0 SSW oder Geburtsgewicht < 1500g	

*** Rotarix** (orale Impfung):

- ▶ Ab der 15. Lebenswoche Eltern ansprechen, da die 1. Dosis spätestens bis zum Alter von 15 Wochen + 6 Tagen durchgeführt sein muss.
- ▶ Am liebsten 2–3 Tage vor Entlassung verabreichen.
- ▶ Bei früherer Entlassung: Vermerk im Procedere, dass die Impfung bis spätestens 15+6 durch die Kinderärztin bzw. den Kinderarzt erfolgen soll.

**** Bexsero:**

- ▶ Nicht gemeinsam mit der Grundimmunisierung verabreichen.
- ▶ Bei Kindern, die nach der 2-Monats-Impfung mit vermehrten Sättigungsabfällen reagiert haben: Impfung stationär planen, am liebsten erst ab 3 Monaten + 2 Wochen wenn vermutlich noch stationär.
- ▶ Paracetamol p.o. zur Fieberprophylaxe:
 - Fix alle 6 Stunden, insgesamt 4 Dosen
 - Erste Dosis 6 Stunden nach der Impfung