

Wirkstoff	Handelpräparat Galenik	Dosierung	NW und KI	Bemerkung
Lactulose	Duphalac® Sirup, 6.7g/10ml Gatinar® Sirup 6.7g/10ml Rudolac® Sirup 6.7g/10ml Importal® Sirup, Pulver (6.7g/10ml; 10g/Sachet≅15ml Sirup)	1-2 g/kg/d in 1-2 ED;entsprechend 1.5- 3ml/kg/d steigern gemäss Wir- kung und Verträglich- keit, max. 2x20ml/Tag	Blähungen, Bauch- krämpfe, Flatulenz	Osmotisch wirksames, synthetisches Dissach- aride. Geeignet zur Erhal- tungstherapie. Länger- fristig gut toleriert.
Paraffinöl	Reines Paraffinöl Paragol N® Sirup Paragar® Sirup enthält Phenolphthalein (Darm- stimulans)	Erhaltungstherapie: ≥ 18 Mt: 5-10 ml po ≥ Jahre: 10-45 ml po	Übelkeit Pneumonitis bei Aspiration Kontraindikation: Kinder <1j, GOER	Gleitmittel. Heraus- sickern aus Anus bei zu hoher Dosierung. Langzeittherapie gut toleriert
Macrogolum 4000 (Laxipeg®) oder Macrogolum 3350 (Movicol®)	Laxipeg Plv® aromafrei (Beutel 10 g, Dose 200 g) Movicol junior® Sachet (Beutel 6.5g) Movicol® Sachet (Beutel 13g) Macrogolum 4000 Phe- ur pulvis, Reinsubstanz (wird am LUKS nicht mehr hergestellt, muss als Magistralrezeptur verordnet werden, z.B. Firma Hänseler)	Initialdosis: 0.4g/kg/Tag Desimpaktion: 1-1.5g/Tag während 6 Tagen; siehe Schema Compendium "Movicol Desimpaktion" Erhaltungstherapie 0.2–0.8 g/kg/Tag, bei Rückhaltenmanöver oft höhere Dosen erfor- derlich Anwendung: 1 Beutel Movicol Junior/ Laxipeg in 70-100ml Flüssigkeit anrühren. Im Kühlschrank 24 Stunden haltbar Bei nasogastrischer Sonde: 20 ml/kg/Std für 4 Std pro Tag	Blähungen, Bauch- schmerzen, Flatu- lenz Im Säuglingsalter <6 Monaten nicht empfohlen (fehlen- de Daten), ab 6 Monaten ausrei- chende Datenlage zur sicheren Ver- wendung Lactulose=erste Wahl im Säuglings- alter	Osmotisch aktiv, aus Macrogolum und Elektrolyten beste- hend. Langzeitthera- pie gut toleriert.
Stimulanzien und Kontakt- laxantien	Dulcolax® (Bisacodyl p.o./p.r.) Darmol®, Zeller- Feigensirup® (Sennaglykoside) Picoprep® (Natrium-picosulfat) Prucaloprid (Resolor®) p.o.			Als 2.Linientherapie, in der Regel off-label, bei Therapie- refraktären Situatio- nen; gehört durch den Spezialisten verordnet und kon- trolliert

Klistier-"PC"	<p>Rektaler Einlauf mit NaCl 0.9% (Urotainer/ Ecobac) 100ml Beutel erwärmt mit Microlax versetzt, dann Applikation via Darm</p> <hr/> <p>Microlax Klist® 1 ml Sorbitol 625 mg</p> <p>Natriumcitrat 90mg Natriumlaurylsulfoacetat 9mg Hilfsstoffe Sorbinsäure, Glycerol</p>	<p>Indikation Dickdarm/Enddarmreinigung vor Diagnostik oder OP Einleitung Behandlung einer schweren Obstipation</p> <p>Übliche Dosierung:</p> <p>< 2 Jahre: 50 ml (1/2 Einlauf)</p> <p>>2 Jahre 100 ml</p> <hr/> <p><i>Microlax®</i></p> <p><i>Kinder > 3 J.:</i> Rektale Einführung eines Tubeninhaltes.</p> <p><i>Kindern unter 3 Jahren</i> Kanüle nur bis zur Hälfte ihrer Länge eingeführt. Ein Tropfen des Tubeninhaltes auf die Kanüle gestrichen genügt als Gleitmittel.</p>	<p>Kontraindikation: Blutungen im Analbereich und rektale Blutungen, Neutropenie, Immunsuppressiva</p>	<p>Neu: Alternative zu dem nicht mehr erhältlichen Yal-Produkt und nicht mehr erhältlichen Phosphat-freien Einlauf Bichsel, Verordnung im Epic unter 'phosphat-freier Einlauf Kispi'</p> <p><small>➡ Nicht signiert – Spital</small> Phosphatfreier Einlauf MICROLAX 1 Klistier, Natriumchlorid (NaCl 0.9 % ECOBAG) 100 ml, 1 Anwendung, rektal, einmalig nach Bedarf, Obstipation, Beginn in Beule um 16:31, Für 1 Dosis Microlax 5ml, in Urotainer NaCl 0.9% 100ml, mischen.</p>
----------------------	--	---	---	---