

Pädiatrische Diabetologie

D3 – Pumpentherapie

erstellt: Dr. J. Mührer, Letzte Version, 09/25

» Korrektur nicht häufiger als 2 ½ stündlich! » Minimale Korrekturmenge = 1 Einheit (Ausnahme gilt bei Kleinkindern <5 Jahren oder Pumpenträger)						Korrektur: » ab BZ > 8 mmol/l (08:00-20:00) » ab BZ > 10 mmol/l (20:00-08:00)						(Patientenetikette)		Formeln zur Korrekturberechnung 08:00 Uhr – 20:00 Uhr: (BZ-8) ÷ _____ 20:00 Uhr – 08:00 Uhr: (BZ-8) ÷ _____							
Tages	Datum:			Hosp.Tag:			Datum:			Hosp.Tag:			Datum:			Hosp.Tag:					
-zeit	Uhr-zeit	BZ	KHW	Novorapid		Basal-rate	E Novo pro KHW	Uhr-zeit	BZ	KHW	Novorapid		Basal-rate	E Novo pro KHW	Uhr-zeit	BZ	KHW	Novorapid		Basal-rate	E Novo pro KHW
				Bolus	Korr.						Bolus	Korr.						Bolus	Korr.		
00-01:00																					
01-02:00																					
02-03:00																					
03-04:00																					
04-05:00																					
05-06:00																					
06-07:00																					
07-08:00																					
08-09:00																					
09-10:00																					
10-11:00																					
11-12:00																					
12-13:00																					
13-14:00																					
14-15:00																					
15-16:00																					
16-17:00																					
17-18:00																					
18-19:00																					
19-20:00																					
20-21:00																					
21-22:00																					
22-23:00																					
23-00:00																					
	Insulingaben+ BR-Kontrolle FD:	Insulingaben+ BR-Kontrolle SD:	Insulingaben + BR-Kontrolle ND:	ARZT:	Insulingaben + BR-Kontrolle FD:	Insulingaben + BR-Kontrolle SD:	Insulingaben + BR-Kontrolle ND:	ARZT:	Insulingaben + BR-Kontrolle FD:	Insulingaben + BR-Kontrolle SD:	Insulingaben + BR-Kontrolle ND:	ARZT:	Insulingaben + BR-Kontrolle FD:	Insulingaben + BR-Kontrolle SD:	Insulingaben + BR-Kontrolle ND:	ARZT:					
Verabreichungsregeln Novorapid:					BZ <4 mmol/l	☐ Hypoglykämie korrigieren, essen, dann spritzen ☐						10gKH ⌵ 1KHW									
					BZ 4-6 mmol/l	Spritzen und sofort essen															
					BZ 6-10 mmol/l	Spritzen, 5 Minuten danach essen															
					BZ >10 mmol/l	Spritzen, 15 Minuten danach essen															