

Child's Glasgow Coma Scale (adaptierter GCS)

maximal 15 Punkte - minimal 3 Punkte

Augen öffnen	< 2 Jahre	2-5 Jahre	> 5 Jahre
4 Punkte	spontan	spontan	spontan
3 Punkte	auf Anruf	auf Anruf	auf Anruf
2 Punkte	auf Schmerzreiz ^a	auf Schmerzreiz ^a	auf Schmerzreiz ^a
1 Punkt	keine Reaktion	keine Reaktion	keine Reaktion
Beste verbale Antwort	< 2 Jahre	2-5 Jahre	> 5 Jahre
5 Punkte	Plappern	altersentsprechend, verständliche Worte	orientiert
4 Punkte	irritiertes Schreien	weniger verständlich als sonst, irritiertes Schreien	desorientiert, verwirrt
3 Punkte	Schreien auf Schmerzreiz ^a	Schreien auf Schmerzreiz ^a	unzusammenhängende Worte
2 Punkte	Stöhnen auf Schmerzreiz ^a	Stöhnen auf Schmerzreiz ^a	unverständliche Laute
1 Punkt	keine Lautäußerung auf Schmerz ^a	keine Lautäußerung auf Schmerz ^a	keine Lautäußerung auf Schmerz ^a
Beste motorische Antwort	< 2 Jahre	2-5 Jahre	> 5 Jahre
6 Punkte	normale Spontanbewegungen	normale Spontanbewegungen	befolgt Befehle
5 Punkte	Wegziehen auf Berührung	Wegziehen auf Berührung	gezielte Abwehr, lokalisiert Schmerzreiz ^a
4 Punkte	Wegziehen auf Schmerzreiz ^b	Wegziehen auf Schmerzreiz ^b	Wegziehen auf Schmerzreiz ^b
3 Punkte	Flexion (Arme) auf Schmerzreiz ^a	Flexion (Arme) auf Schmerzreiz ^a	Flexion (Arme) auf Schmerzreiz ^a
2 Punkte	Extension (Arme, Beine, Kopf) auf Schmerzreiz ^a	Extension (Arme, Beine, Kopf) auf Schmerzreiz ^a	Extension (Arme, Beine, Kopf) auf Schmerzreiz ^a
1 Punkt	keine Reaktion auf Schmerzreiz ^a	keine Reaktion auf Schmerzreiz ^a	keine Reaktion auf Schmerzreiz ^a

a: Druck glabellär (zwischen medialen Enden der Augenbrauen) oder Sternum

b: Druck auf Fingernagelbett eines ausgestreckten Fingers (z. B. mit Kugelschreiber)

Quellen:

Pediatric coma scales. Kirkham FJ et al. Dev Med Child Neurol. 2008 Apr; 50(4):267-74.
 Betreuung des kindlichen Schädelhirntraumas. Vernet O et al. Paediatrica 15(4), 2004; 43-47



Flexion auf Schmerzreiz, 3 Pkt



Extension auf Schmerzreiz, 2 Pkt