HUS = ???

Juni 2011 / TN

Cholera outbreak kills 352 in Nigeria

■ Schweiz

- Gastroenteritis mit Rotaviren... → Dehydrierung
- Risikofaktor: Gabe von NSAR (Ibuprofen ...)

Spitalalltag 1: Erfassung der Dehydrierung

1. **Gewicht!** aber: - Vorgewicht oft nicht bekannt
- verschiedene Waagen ...
2. **Klinische Zeichen!** (s. Tabelle)
- Urinmenge?! cave: wässriger Durchfall...
3. **Laborbefunde**
- meist nicht hilfreich und ohne Einfluss auf Procedere!
- Blut: Natrium, Blutgase ...
- Urin: spezifisches Gewicht

Milde Dehydrierung

Mittelschwere Dehydrierung

Schwere Dehydrierung

■ Gewichtsverlust	< 5% Körpergewicht	5 – 10 % KG	> 10% KG
■ ECV-Defizit	< 50 ml / kg	50 -100 ml / kg	> 100 ml / kg
■ Allgemeinzustand	durstig, wach komatös,	durstig unruhig (selten: irritabel, apathisch, somnolent)	somnolent, soporös, Krämpfe, Akrozyanose, kühle Peripherie
■ Rekapillarisation	rasch	bis 2 sec	> 2 sec
■ Periphere Pulse	normal und kräftig	tachykard	tachykard, schwach bis nicht palpabel
■ Atemfrequenz	normal	evtl. tachypnoisch und tief	tachypnoisch und tief
■ Fontanelle	normal	eingesunken	tief eingesunken
■ Hautturgor	normal	vermindert	stehende Hautfalten
■ Schleimhäute	feucht	trocken	sehr trocken
■ Augen	normal	mässig haloniert	sehr haloniert, keine Tränen
■ Urinmenge	normal	Oligurie, konzentriert	Oligo-Anurie, stark konzentriert

→ **Achtung: bei Durchfall Urinmenge oft sehr schwierig zu beurteilen** → **ev. Blasenkatheter legen!**

Spitalalltag 2: Pat mit (blutiger) Gastroenteritis

- frühzeitiges Erkennen eines Nierenversagens / HUS
 - Urinmenge?
 - Oligurie - Anurie: Urin vs Durchfall?
 - Blasenkatheter?
- Allgemeinzustand?
 - Vitalparameter - Kreislauf
 - Blässe - Apathie
- Symptomatische Therapie
 - Schmerzmittel: Paracetamol, ev. Novalgin
 - keine** NSAR

HUS = Hämolytisch-urämische Syndrome (1)

- 1955: Gasser et al: Erstbeschreibung aus Kispi ZH
- 5 Kinder mit HUS, alle verstorben
 - 2 mit Durchfall)
 - 2 mit Pneumokokken-Infektion) „Vielfalt“ !
 - 1 „ohne“ Ursache)

HUS = Hämolytisch-urämische Syndrome (2)

- Hämolytische, mikroangiopathische Anämie:
Fragmentozyten, LDH ↑, Coombs negativ
- Thrombocytopenie
- Urämie²: akute Niereninsuffizienz
- Weitere Symptome / Komplikationen
 - ZNS (Krämpfe, Blutungen)
 - Hypertonie und Herzinsuffizienz
 - Pankreatitis (mit Diabetes mellitus)
 - Invagination
 - Retinablutungen ...

HUS = Hämolytisch-urämische Syndrome (3)

■ DD HUS

■ Durchfall positiv (D+HUS) vs Durchfall negativ (D-HUS)

- erst seit 90-er Jahren „klar“: trotz Gasser 1955 ...

- Unterschiede: Ursache und **Prognose**

■ HUS =

- häufigste Ursache für akute Niereninsuffizienz bei (Klein)-Kindern

- DD: meist prärenal, v.a. Sepsis, Schock (v.a. postop. nach Herzop), seltener GN

D+ HUS: 1 2/12 jährige Patientin XX (1)

- 27.12.99 **blutiger Durchfall, Erbrechen, Fieber**
- 29.12. „Fieber“-Krampf ?!
- 30.12. 2. Krampf: Schädel-CT ob, Na: 131 mmol/l

- **DD ??**

■ DD Blutige Diarrhöe

- 4 x: Salmonellen, Shigellen, Campylobacter, Yersinien ...
- Antibiotika-induzierte Colitis
- Chronisch-entzündliche Darmkrankheiten

und

■ Verotoxin-produzierende enterohämorrhagische *E. coli*: VTEC, resp. EHEC

D+ HUS: 1 2/12 jährige Patientin XX (2)

- **27.12.99** blutiger Durchfall, Erbrechen, Fieber
- 29.12. „Fieber“-Krampf ?!
- 30.12. 2. Krampf: Schädel-CT ob, Na: 131 mmol/l
- 1.1.2000 Oedeme, blutiges Erbrechen, Tachypnoe, 3. Krampf
- **2.1.2000** Anämie: Hb 54 g/l, LDH: 9000 U/l; Tc-penie: 8 G/l
(nach 6 d!) Natrium tief: 121 mmol/l (zu viel H₂O)
Kreatinin: 250 umol/l, Harnstoff: 25 mmol/l
Stuhl: Verotoxin-prod. *E. Coli* positiv
Beginn → Peritoneal-Dialyse

D+ HUS: Patientin XX (3)

- 4.1. Lunge: Intubation bei ARDS
Niere: Peritonealdialyse → Hämofiltration
- 15.1. Niere: Hämofiltration → PD
allgemeine Besserung AZ und Beginn
Urinproduktion !
- 16.1. **Hirn: akute Hirndruck-Symptome**
Schädel-CT: Subdural-Blutung und
Einklemmung Hirnstamm

Exitus letalis bei D+ HUS

D+ HUS = $\geq 75\%$

- Verotoxin-prod. enterohämorrhagische *E. coli*
 - Serotypen...: **O157:H7 in CH selten**, in USA häufig
 - O: somatic, H: flagellar antigen

E. coli serotypes that cause hemorrhagic diarrhea.

- In CH: selten Shigellen etc

D+ HUS = $\geq 75\%$

- **Quelle:** Rohmilch, ungenügend gekochtes Rindfleisch (“Big-Mac Disease”); selten Mensch zu Mensch !

MSIS OPERATIONS MANUAL Chapter 1
Appendix 10

CATEGORY 1 CRITERIA

- Dry - see Appendix 2⁹
- Clean with regard to faeces/dirt
- Very minor amounts of loosely adherent straw/bedding

ACTION

- Process as normal

D+ HUS = ≥ 75 %

- **Verotoxin-produzierende enterohämorrhagische *E. coli*: VTEC, resp. EHEC**

- **DD Blutige Diarrhöe**

- 4 x:** Salmonellen, Shigellen, Campylobacter, Yersinien ...
- Antibiotika-induzierte Colitis
- Chronisch-entzündliche Darmkrankheiten

D+ HUS

■ Akute Phase

- Dialyse 75 %
- Definitives Nierenversagen < 5 %
- Letalität (kardial / cerebral) 5 – 10 %

■ Follow-up

- Remission > 50 %
- Niereninsuffizienz (Kreatinin ↑), Hypertonie,
Proteinurie: nach 10 – 20 Jahren bis 50 %
- definitives Nierenversagen $\geq$ (?) 10 %
- Rezidiv nein

D+ HUS: Pathogenese (1)

- Ingestion von VTEC / EHEC *E. coli*
- EHEC binden an Darmepithelien (sind nicht invasiv!) und setzen Toxine und Lipopolysaccharide (LPS) frei:
- **ca. 10% aller Patienten mit Ingestion von EHEC → hämorrhagische Colitis**
- Translokation und hämatogene Verbreitung des Toxins und LPS via ?? (früher: via Neutrophile, aber nicht bestätigt ...)
 - keine Bakteriämie
 - selten: Mensch - Mensch Übertragung / familiäre Fälle

Pathogenese

Fragmentocyten

Thrombocytopenie

Endothelschaden

D+ HUS: Pathogenese (2)

- **10% aller Kinder mit Colitis entwickeln ein HUS**
- Verotoxin resp. Shigatoxin 1 und 2 (Shigellen):
 - 5 x B Subunits: binden z.B. an Blutgruppen-Antigene (Pk, P, P₁) und **Gb3 (Globotriaosylceramid)**
 - 1 x A Subunit: hemmt ribosomale RNA und somit auch Proteinsynthese → Zelltod / Apoptose

- Nierenkapillaren
 - **exprimieren Gb3** → Toxin internalisiert → Zelltod/Apoptose
 - Sekundär: lokale Aktivierung der Gerinnung → Fibrinthromben in den Kapillaren der Glomeruli

D+ HUS: Pathogenese (3)

■ Anämie / Thrombocytopenie:

- direkte Bindung des Toxins ?
- Verbrauch in den Nieren ?
- aber keine disseminierte intravasale Gerinnung

■ Warum nur 10% mit Colitis, resp. 1% mit HUS ?

- Unterschiedliche "Dosis" (Bakt. resp. Toxin) ?
- Genetische Prädisposition: Gen-Polymorphismen, z.B. Gb3, Komplement ? Protektive Gene ? Promotoren ?

D+ HUS: Therapie

■ Rein symptomatisch

- Volumen- und Elektrolyt-Zufuhr
- Dialyse
- Ec-Transfusion bei ausgeprägter Anämie: Hb < 55 g/l
- Tc-Transfusionen: nur falls
 - Einlage zentraler Katheter
 - Blutungen (aber zum Glück selten...)

■ **Keine** Antibiotika / Steroide / Immunglobuline

■ Plasmapherese / Eculizumab (anti-C5) bei ZNS-Beteiligung!?

1970 – 95: D + HUS Altersverteilung: n = 43 (Zürich)

1970 – 95: D + HUS Altersverteilung: n = 43 (Zürich)

„wie bei typischer Kinderkrankheit“

Impfung gegen Verotoxin oder Oberflächen-Antigene ?!

D- = atypisches HUS: < 25 %: DD (1)

■ Pneumokokken: Pneumonie, Sepsis, Meningitis

■ 1° genetisch (AD, AR)

□ Mangel an Komplement Faktoren H / I ...

□ Mangel an v. Willebrand cleaving protease = **ADAMTS-13**

□ Intrazellulärer B12-Mangel

D- = atypisches HUS und Komplementsystem

Bannardeaux et al., *Lancet*, 2003

Noris M et al., *Lancet*, 2003

luzerner kantonsspital

KINDERSPITAL LUZERN

D- = atypisches HUS: < 25 %: DD (2)

- **Im Rahmen eines SLE (Lupus erythematodes) und disseminierter Mikroangiopathie**
- **bei Adulten**
 - Schwangerschaft / Medikamente...
- **Varia**
- **Abgrenzung / Übergang zu TTP = Thrombotisch-Thrombozytopenische Purpura ?!**

D- = atypisches HUS: Verlauf (3)

■ Akute Phase:

- Dialyse 75 %
- Definitives Nierenversagen **25 %**
- Letalität (kardial / cerebral) **- 20 %**

■ Follow-up:

- Remission **selten**
- Niereninsuffizienz, (Kreatinin ↑), Hypertonie,
Proteinurie: nach 10 – 20 Jahren: **Mehrzahl**
- definitives Nierenversagen **> 50 %**
- Rezidiv **bis 20%, auch nach Tx!**

D- = atypisches HUS: Therapie (4)

■ Symptomatisch

- Volumen- und Elektrolyt-Zufuhr
- Dialyse
- Ec- und Tc-Transfusion

■ Antibiotika

- bei Pneumokokken

■ Plasma-Infusionen / oder Plasmaaustausch

- bei 1° Mangel an Komplement- oder Gerinnungsfaktoren

1970 – 95: D- HUS Altersverteilung : n = 23 (Zürich)

Zürich: Epidemiologie HUS

Period	N	Per year	D + (n)	Exitus	ESRF	D - (n)	Exitus	ESRF	D+ /D -
1970 – 79	14	1.4	7			7			1 : 1
1980 – 89	25	2.5	16			9			1.8 : 1
1970 – 1994	63	2.5	40	2	1	23	7	8	1,8 : 1
1995 – 2005	68	6.2	52	4	4	16	3	4	3.2 : 1
Total	131	3.6	92	6 (7%)	5 (6%)	39	10 (26%)	12 (31%)	2.4 : 1

Spitalalltag 1: Erfassung der Dehydrierung

1. **Gewicht!** aber: - Vorgewicht oft nicht bekannt
- verschiedene Waagen ...
2. **Klinische Zeichen!** (s. Tabelle)
 - Urinmenge?! cave: wässriger Durchfall...
3. **Laborbefunde**
 - meist nicht hilfreich und ohne Einfluss auf Procedere!
 - Blut: Natrium, Blutgase ...
 - Urin: spezifisches Gewicht

Spitalalltag 2: Pat mit (blutiger) Gastroenteritis

- frühzeitiges Erkennen eines Nierenversagens / HUS
 - Urinmenge?
 - Oligurie - Anurie: Urin vs Durchfall?
 - Blasenkatheter?
- Allgemeinzustand?
 - Vitalparameter - Kreislauf
 - Blässe - Apathie
- Symptomatische Therapie
 - Schmerzmittel ... (keine NSAR)

Nephrologie 9

Abklärung und Therapie: typisches und atypisches HUS (Hämolytisch-urämisches Syndrom)

1. Definitionen

1.1. D+ HUS: sog. "typisches" Durchfall-positives HUS"

- Verotoxin (Shigatoxin)-assoziiert: meist *E. coli*, in CH selten andere Bakterien wie Shigellen
- selten familiäre Infektionskette

1.2. D- HUS: sog. durchfall-negatives = "atypisches" HUS

- Pneumokokken-assoziiert (meist T-Antigen positiv)
- familiär/genetisch: autosomal dominant / rezessiv; z.T. rezidivierend
 - Mutation in Faktor H, I, MCP (Serumwerte können aber dennoch normal sein !)
 - v. Willebrand Faktor-Cleaving Protease-mangel (=ADAMTS 13; 1° oder 2° wegen Auto-AK)
 - Vitamin B12 Stoffwechsel
- cave: HUS im Rahmen eines Lupus (SLE; C3 tief)
- Kombination: HUS und postinfektiöse Glomerulonephritis (C3 tief, Dg in der Regel nur histoloaisch möalich)

HUS: Zusammenfassung

- Definition
- Unterschiede: D+ vs D-
 - Ursache(n)
 - Häufigkeit
 - Therapie
 - Verlauf / Komplikationen
 - Prognose
- In Luzern/CH am häufigsten
 - D+HUS mit VTEC *E. coli*
 - daran denken