

## Merkblatt zur Nachbehandlung nach Beschneidung / Zirkumzision

### Kinderspital

---

Kinderchirurgie  
Chefarzt: Prof. Dr. med. Ph. Szavay

Sekretariat: marianne.buergisser@luks.ch  
Telefon 041 205 31 55  
Fax 041 205 31 57

Liebe Eltern,

Bei Ihrem Sohn wurde eine Beschneidung durchgeführt. Folgende Informationen sollen Ihnen in den kommenden Tagen helfen:

### Allgemeine Hinweise

- Eine **Wundkontrolle** beim eigenen Kinder-/Hausarzt ist nach 3-4 Tagen empfohlen. Wir bitten Sie, selber einen Termin zu vereinbaren.
- Der Verband (Vaseline, Gaze) sollte nach jedem Wasserlösen für 10-14 Tage erneuert werden.
- Es ist keine **Fadenentfernung** nötig. Der verwendete Faden fällt nach 7-10 Tagen ab, bis er vollständig aufgelöst ist dauert es ca. 6 Wochen.
- Geben Sie **Schmerzmittel** nach dem Bedarf Ihres Kindes.
- Kein Spielplatz / Turnen / **Sport** 2 Wochen (Gefahr der Wunddehiszenz = Auseinanderweichen der Wundränder, Schmerzen, Infekt).
- Kein Baden oder **Schwimmen** für 2 Wochen (Infektionsgefahr). Duschen nach 24h erlaubt.

### Blauverfärbung

Es kann sein, dass es nach dieser Operation zu einer Blauverfärbung des Penis kommt. Die Blauverfärbung bedeutet, dass es etwas nachgeblutet hat. Dies ist harmlos. Wie ein "Bläuele" oder "blauer Fleck", wird sie in den kommenden Tagen von alleine verschwinden.

### Wundinfekt

Der **Wundinfekt** ist eine der häufigsten allgemeinen Komplikationen nach einem operativen Eingriff, und tritt - wenn es dazu kommt – meistens am 3./4 Tag nach der Operation auf. Folgende Zeichen zeigen Ihnen einen Wundinfekt an:

1. zunehmende (pochende) Schmerzen
2. Rötung
3. Überwärmung
4. Schwellung
5. Eiteraustritt aus der Wunde

Bitte nehmen Sie in diesem Fall Kontakt mit Ihrem Kinderarzt oder mit uns auf.

### Schwellung

Eine Schwellung des Penis nach dieser Operation ist häufig, und wird nach 24-48h in der Regel von alleine zurückgehen.

### **Gelblicher Wundbelag**

Häufig bildet sich nach dieser Operation durch das Lösen der Vorhaut von der Eichel im Verlauf ein gelblicher Belag auf der Eichel. Wenn Ihr Kind ansonsten beschwerdefrei ist, handelt es sich sehr wahrscheinlich um Fibrin. Fibrin ist ein Eiweiss, das natürlicherweise im Rahmen der Wundheilung vom Körper gebildet wird. Dieser Belag ohne Zeichen einer Infektion ist harmlos und Bedarf keiner Behandlung.

### **Festhaftender Verband**

Falls der Verband fest am Penis haftet und nicht entfernt werden kann, so setzen Sie Ihr Kind in ein warmes Wasserbad, bis sich der Verband von selber löst.  
Achten Sie beim nächsten Verband darauf, genügend Vaseline aufzutragen.

### **Kontakt**

Im Notfall Dienstarzt Kinderchirurgie Tel. 041 205 12 50