

AUFKLÄRUNGSGESPRÄCH durch _____ Arzt/Ärztin

Diagnose Unguis incarnatus Dig ___ Fuss / Hand, links / rechts, lateral / medial
Operation Nagelkeilexzision nach Kocher

Gesprächspartner/in: _____ Datum: _____
 Dolmetscher/in: _____ Zeitpunkt _____ Dauer: _____
 Hilfsmittel: Bilder/Photo Fachbuch Modelle anderes: _____

Notwendigkeit und Dringlichkeit

Rundes Nagelkürzen und/oder enge Schuhe führen zur Krümmung des Nagels an der Seite, was zur Entzündung des Nagelwalls führen kann. Beim Abschneiden der Nagelecke bleibt meistens ein spitzes Nagelstück (Nagelsporn) stehen, welches sich beim Vorwachsen in den Nagelwall bohrt, und zu Schmerzen und Entzündung führen kann.


Voraussichtlicher Verlauf

Ohne Behandlung kann es rezidivierend zu Schmerzen und Entzündungen kommen.

Durch die *Operation* wird die Ursache (d.h. der verbreiterte, gekrümmte Nagelanteil) entfernt, Entzündung und Schmerzen treten dann nicht mehr auf.

Operationsmethode

Vorbehandlung: Bei starker Entzündung muss diese zuerst zum Abklingen gebracht werden (Fussbäder, Salbe, eventuell Antibiotikum).



Operation: Der seitliche Teil des Nagels, des Nagelbettes, die dazugehörige Nagelwurzel und der seitliche Nagelwal werden keilförmig herausgeschnitten. Die Wunde wird am oberen und unteren Rand mit einer Naht adaptiert. Dadurch kommt es zu einer Verschmälerung des Nagels

In der Regel wird dieser Eingriff in Allgemeinanästhesie durchgeführt.

Therapiealternativen

Keine sinnvollen Alternativen, auch nicht das Entfernen des gesamten Nagels, da die Nagelwachstumszone den Nagel wie zuvor ausbildet, d.h. auch der neue Nagel wird wahrscheinlich wieder einwachsen.

Mögliche Komplikationen

Allgemein: Blutung, Infektion
Spezifisch: Rezidiv (=Wiederauftreten)

Spezielle Risikofaktoren des Patienten

Behandlungsplan nach der OP

Regelmässige Wundkontrollen durch den Kinderarzt
Tägliches Zehenbad (Prontosan)
Fadenentfernungen nach 10-14 Tagen
Fuss schonen, Hochlagerung, Fersengang
Kein Sport, Turnen, Spielplatz 14 Tage
Kein Baden oder Schwimmen in den ersten 14 Tagen
Duschen nach 24h erlaubt
Vermeiden von engem Schuhwerk
Gerader Nagelschnitt
Schmerztherapie nach Bedarf

Fragen und Wünsche der Eltern

Bemerkungen

Die verantwortliche Person (Elternteil oder gesetzl. Vertreter) hat sich nach der Aufklärung für die Operation (inkl. besprochenen Erweiterungen) entschieden.

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters des Patienten
(Eltern, Vormund, etc.)

Patient (> 12-14 Jahre alt, urteilsfähig)

Unterschrift Arzt/Ärztin

Luzern,